

Varroa-Bekämpfung mit Ameisensäure und Schwammtuch



Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Säuren:

- ✓ Schutzbrille!
- ✓ Wassereimer
- ✓ Spritzflasche mit Wasser als Augendusche
- ✓ Säurefeste Handschuhe
- ✓ Dämpfe nicht einatmen!



**Säure niemals in andere Gefäße (Sprudelflaschen etc.) umfüllen!!
kindersicher aufbewahren!**

Anwendung des Schwammtuchs

- Behandlung morgens bei kühleren Temperaturen beginnen
- Schwammtuch auf eine säurefesten Unterlage (z.B. Windel) legen und mit entsprechender Menge Ameisensäure tränken
- 2 ml **60% Ameisensäure** pro DN/ Zander-Rähmchen, also 40 ml bei einem zweizargigen Bienenvolk (**Behandlung von oben**)
- Unbedingt Handschuhe und Schutzbrille tragen!
- **Vorsicht:** Kann bei heißen Temperaturen und bei Bienenvölkern, die ganztags in der Sonne stehen, zu starker Unruhe der Bienen und Königinnenverlusten führen („Schockbehandlung“)
- **Das Schwammtuch wird daher nur als „Notmaßnahme“ bei länger andauernden feucht/ kaltem Wetter empfohlen (z.B. August 2014). Ansonsten sind Liebig-Dispenser und Nassenheider professional vorzuziehen!**